Literatur.

Dall, W. H., Contributions to the Tertiary Fauna of Florida. Part. V. — In: Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. vol. 3 part. 5 (December 1900) p. 949—1189, pl. 36—47.

Der fünfte Theil dieses wichtigen Werkes enthält im Texte die erste Hälfte der Bilvalven; der sechste soll das Ganze zum Abschluss bringen. Als neue Arten werden beschrieben: Solen amphistemma t. 39 f. 8; — Donax chipolana t. 44 f. 20; — Semele chipolana t. 37 f. 3; S. silicata t. 38 f. 6; — S. smithi t. 43 f. 4; — S. leana t. 37 f. 1, 2; — S. cytheroidea t. 44 f. 5; — Abra triangulata t. 49 f. 4; — Tellina eutaenia t. 46 f. 2; — T. cynoglossa t. 46 f. 27; — T. aldrichi, t. 46 f. 9; — T. chipolana t. 47 f. 6; — T. strophia t. 47 f. 11; — T. segregata t. 37 f. 7, 8; — T. merula t. 46 f. 4: — T. cloneta t. 46 f. 8; — T. acrocosmia t. 46 t. 10; — T. halidona t. 38 f. 3; — T. sclera t. 49 f. 5: — T. hypolispa t. 46 f. 23; — T. lepidota t. 46 f. 18; — T. halistrepta t. 47 f. 17; — T. roburina t. 47 f. 9; — T. simpsoni t. 46 f. 12; — T. acloneta t. 46 f. 16; — T. pharcida t. 46 f. 7; — T. nucinella t. 46 f. 19; — T. pressa t. 47 f. 5; — T. acosmita t. 46 f. 1; — T. agria t. 46 f. 11; — T. acalypta t. 47 f. 12; — T. scitula t. 47 f. 15; — T. lampra t. 46 f. 14; — T. scapha t. 47 f. 16; — T. caloosana t. 47 f. 2; — T. dinomera t. 47 f. 19; — T. suberis t. 46 f. 25; — T. dupliniana t. 46 f. 17; — T. umbra t. 46 f. 13; — T. propetenella t. 46 f. 6; — T. macilenta t. 46 f. 20; — T. propetenera t. 47 f. 7; — T. calliglypta t. 47 f. 1: — Metis trinitaria t. 46 f. 24; — M. chipolana t. 47 f. 21; — M. magnoliana t. 49 f. 6; — Macoma? calhounensis t. 47 f. 10; — M. irma t. 46 f. 15; — M. conradi t. 47 f. 3; — M. alumensis t. 47 f. 8; — M. laxa t. 47 f. 14; — M. kelseyi t. 49 f. 7; — M. tracta t. 47 f. 13: — M. olivella t. 47 f. 20; — M. holmesii t. 47 f. 4; — M. tageliformis p. 1055; — M. vendriesi t. 46 f. 3: — Petricola harrisii t. 43 f. 1; — P. calvertensis t. 44 f. 14; — Cooperella carpenteri t. 49 f. 8; — Isocardia floridana t. 46 f. 21, 26; — Is. carolina t. 46 f. 22; — Cardium propeciliare t. 48 f. 12; — C. ctenolium t. 40 f. 13; — C. acrocome t. 48 f. 2: — C. dominicanum t. 48 f. 16; — C. cestum t. 48 f. 14; — C. delphicum t. 48 f. 18: — C. praecursor t. 48 f. 10; — C. virile t, 48 f. 1; —

C. parile t. 48 f. 17; — C. malacum f. 48 f. 4; — C. waltonianum t. 48 f. 19; — C. pausatrum t. 40 f. 14; — C. druidicum t. 40 f. 7; — C. taeniopleura t. 49 f. 1, 2; — C. phlyctaena t. 48 f. 13; — C. chipolanum t. 40 f. 8; — C. taphrium t. 40 f. 9; — C. gatunense p. 1100; — C. burnsii t. 48 f. 15; — C. arestum t. 40 f. 10; — C. alicula t. 40 f. 10; — C. simrothi t. 48 f. f. 8; — C. aminense t. 48 f. 11; — C. maturense t. 48 f. 7; — C. apateticum t. 48 f. 6; — C. willcoxi t. 48 f. 9; — C. bulbosum t. 48 f. 20; — C. compressum t. 48 f. 21; — Protocardia jamaicensis t. 48 f. 3; — Solecardia cossmanni t. 45 f. 27; — Sportella obolus t. 44 f. 18: — Sp. unicarinata t. 44 f. 13; — Sp. lubriea t. 44 f. 9; — Sp. lioconcha t. 44 f. 24; — Sp. petropolitana t. 45 f. 10; — Sp. yorkensis t. 44 f. 1; — Sp. pelex t. 44 f. 10; — Anisodonta bowdeniana p. 1133; — An. americana t. 36 f. 7; — Hindsiella nephritica t. 45 f. 8; — H. carolinensis t. 45 f. 4; — H. acuta t. 49 f. 9; — Erycina pellucida t. 44 f. 7, 12; — Er. undosa t. 45 f. 3; — Er. chipolana t. 44 f. 15, t. 45 f. 17; — Er. fabulina t. 45 f. 1; — Er. curtidens t. 45 f. 14, 15: — Er. carolinensis t. 44 f. 3, 22; — Er. americana t. 44 f. 21, 25; — Er. protracta t. 45 f. 22; — Bornia scintillata t. 49 f. 10; — B. plectopygia t. 49 f. 9; — B. dodona t. 45 f. 16; — B. floridana t. 45 f. 2; — B. biangula p. 1151; — B. rota t. 45 f. 11; — Rochefortia stantoni t. 43 f. 11: — R. stimpsoni t. 45 f. 5: — Alveinus rotundus t. 45 f. 25, 28; — Montacuta claiborniana t. 45 f. 21; — M.? chipolana t. 44 f. 4; — M. actinophora t. 44 f. 2; — M. mariana t. 45 f. 18; — M. petropolitana t. 45 f. 16; — M. sagrinata t. 44 f. 8; — Diplodonta minor t. 44 f. 17; — D. puncturella t. 45 f. 26; — D. radiata t. 44 f. 11; — D. yorkensis t. 43 f. 5; — D. calvosaensis t. 44 f. 16.

Schmidt, Louis, die Mollusken des Seebergs. In: Naturwissenschaftliches und Geschichtliches vom Seeberg, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Gotha. 1901. p. 114—117.

41 Arten, sämmtlich weitverbreitete deutsche Formen.

Proceedings of the Malacological Society of London Vol. 4, No. 4. March 1901.

p. 151. Pilsbry, H. A., Morphological and descriptive Notes on the Genus Cryptoplax. With pl. 14 und 15.

p. 158. Pilsbry, H. A., Anatomy of Beddomea and Relationships of Amphidromus. — With pl. 16. — Beddomea gehört zu Amphidromus und mit diesem zu den Helicidae epiphallogonae in die nächste Nähe von Camaena und Chloritis.

„ 163. Elliot, Sir. C., Notes on a remarkable Nudibranch from North-West America. With figs. — Zwischenform zwischen den Tritonidae und Dorididae, der indess kein Name beigelegt wird.

„ 166. Murdoch, R., Anatomy of some Agnathous Molluscs from New Zealand. With pl. 17. Gibt die Anatomie von Rhytida greenwoodi, Gray, Rh. meesoni. Suter, Rhenea corasia, Gray, Schizoglossa novoseelandica, Pfr., Paryphanta hochstetteri, Pfr. und Natalina caffra, Fér.

„ 174. Murdoch, R., on the Anatomy of Buliminus djurdjurensis, Ancey from the Djurdjura Mountains, Kabilia. — With figs.

„ 178. Blanford, W. T., Note on Bensonia, and on an apparently undescribed species, B. mimela (woodcut).

„ 180. Blanford, W. T., Note on Bensonia mainwaringi and Macrochlamys dalingensis (woodcut).

„ 183. Kennard, A. S. and B. B. Woodward, Further Notes on the British Pliocene non marine Mollusca.

Miller, Prof. K., die Schneckenfauna des Steinheimer Obermiocäns. — In: Jahresh. Ver. vaterl. Naturkunde, 1900 p. 385—406, Taf. 7.

Neuere Entdeckungen haben die Steinheimer Fauna eng an die sonstige Obermiocänfauna angeschlossen; bekannt sind jetzt 33 Arten. Als neu beschrieben werden Leucochilus suevica var. minor p. 398; — Jsthmia lentilis Miller p. 406.

Luther, A., Bidrag til kännedomen om Land- och Sötvattengastropodernas utbredning i Finland. Med en Karta. — In: Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica v. 20 no. 3.

Der Autor theilt der beigebenen Karte nach — der schwedische Text ist mir leider unverständlich — Finland zoogeographisch in eine östliche und eine westliche Hälfte, deren Grenze mit einigen Abweichungen dem 28 ö. L. entspricht, und in 29 Bezirke; jede Molluskenart wird in ihrer Verbreitung ausführlich erörtert.

Luther, A., Verzeichniss der Land- und Süsswassermollusken der Umgebungen Revals, ein Beitrag zur Fauna Esthlands. — In: Acta Soc. Flor. et Fauna Fennica, v. 10, No. 2.

65 Arten, davon 12 (und 3 Varietäten) neu für Esthland. Von Interesse ist das Vorkommen von Pupa arctica.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 1900, Part. III.

p. 550. Pilsbry Henry A., Lower Californian Species of Coelocentrum and Berendtia. — Neu Coeloc. minorinum var. gabbi p. 551 f. 1; — C. eisenianum p. 553 f. 2. Ferner ist C. irregulare Gabb abgebildet. — Die Gattung Berendtia Crosse unterscheidet sich von Coelocentrum nur durch die schlankere, nicht hohle Spindelachse.

„ 556. Pilsbry, H. A., Sonorella, a new genus of Helices. — Gegründet auf Epiphragmophora hachitana, Dall, die sich anatomisch neben Ashmunella stellt.

„ 561. Pilsbry, H. A., on the zoological position of Partula and Achatinella. Der Verfasser stellt den Grundsatz auf, dass der sicherste Anhaltspunkt für die Classification der Pulmonaten durch die Modificationen von Niere und Ureter gegeben werde und dass die Gattungen, deren Ureter gerade von der Niere zum vorderen Rand der Lungenhöhle lauft (Orthurethra), die ältesten sind und sich unmittelbar an die Basommatophoren anschliessen. Die Partulidae, Achatinellidae, Pupidae einschliesslich Buliminus, und wahrscheinlich Vallonia und Cochlicopa sind somit als die ältesten Pulmonaten anzusehen.

„ 568. Pilsbry, H. A., the Genesis of the Mid-pacific Fauna. Der Verfasser kommt gestützt auf die vorhergehende Arbeit, in scharfem Gegensatz zu Hedley zu der Ansicht, dass die Fauna der micronesischen Inseln der Rest einer mesozoischen oder selbst palaeozoischen Kontinentalfauna sei.

„ 582. Pilsbry, H. A. & E. G. Vanatta, a partial Revision of the Pupae of the United States. Zahlreiche Arten werden abgebildet. Von Interesse ist der Nachweis, dass Pupa fallax Say und Pupa placida Say beide identisch sind mit Buliminus obscurus Müll., während die gewöhnlich als fallax bezeichnete Art Pupoides marginatus Say heissen muss.

p. 672. Pilsbry, Henry A., Additions to the Japanese Land- snail Fauna III. Beschäftigt sich mit den von Hirase neu entdeckten Clausilien. Neu Section *Zaptix* für Clausilia hirasei, Pilsbry; — Euphaedusa comas p. 673 t. 24 f. 3; — Euph. monelasmus p. 674 t. 24 f, 4—6; Euph. jotaptyx p. 674 t. 25 f. 7—9; — *Tyrannophaedusa* n. sect für Cl. mikado n. p. 676 t. 24 f. 10—12; — Stereoph. brevior var. addisoni p. 677; — Ster. hondana p. 676 t. 24 f. 13—18; — Ster. subjaponica p. 578; — Hemiph. nolani p. 679 t. 35 f. 19—21; — Hem. tosana p. 680 t. 25 f. 22—25, 41; — Hem. shikokuensis p. 681 t. 25 f. 30—32.

Martini & Chemnitz, Conchylien-Cabinet, zweite Auflage.

p. 460. Kobelt, W., Buliminus (und Auriculacea Schluss). Neu Bul. roseni t. 105 f. 7, 8; — Bul. schuschaensis t. 107 f. 9, 19; — Clavator heimburgi t. 107 f. 13, 14; — Pedipes liratulus t. 33 f. 20, 21; — zum erstenmal abgebildet Bul. exquisitus Naeg. t. 104 f. 1—4; — Bul. andersonianus Mlldff. t. 104 f. 5, 6; — Bul. rarus Naeg. t. 104 f. 7—9; — Bul. hispalensis Westerl. t. 104 f. 12—15; — Bul. acbensis Naeg. t. 104 f. 16, 17; — Bul. kasnakowi Westerl. t. 105 f. 3, 4; — Bul. otostomus West. t. 105 f. 5, 6; — Bul. drymaeus Westerl. t. 105 f. 9—12; — Bul. warentzowi Rosen t. 105 f. 22, 23; — Bul. pindicus Westerl. t. 105 f. 24, 25; — Bul. munitus Westerl. t. 105 f. 26, 27; — Bul. giuricus Westerl. t. 105 f. 28, 29; — Bul. djurdjurensis Westerl. t. 105 f. 10, 11; — Bul. libanicus Naeg. t. 107 f. 11, 12; — Bul. limbodentatus var. ajax und var. consobrinus t. 107 f. 15—19; — Bul. continens Rosen t. 107 f. 20, 21; — Bul. sodalis Westerl. t. 107 f. 22, 23; — Bul. oribatha Westerl. t. 107 f. 24, 25; — Bul. sexdentatus Naeg. t. 107 f. 26, 27; — Bul. miser var. misellus Westerl. t. 107 f. 28, 29.

„ 461. Clessin, S., Vermetidae Taf. 1—6 und Eulimidae Bogen 26—30. — Keine n. sp.

Möllendorff, Dr. O. von, Landmollusken, drittes Heft. — In: Sempers Reisen im Archipel der Philippinen. Vol. VIII.

Enthält die Gattungen Otesia, Sitala, Kaliella und Microcystina mit den Tafeln 11—13.

Journal de Conchyliologie, vol. 49, No. 2.

p. 77. Vayssière, A., Etude zoologique et anatomique de la Mitra zonata Marr. (avec pl. 3).

p. 96. Fischer, H., Liste des Coquilles recueillies par M. de Gennes à Djibuti et Ali-Sabieh, avec description de plusieurs espèces nouvelles. — Neu: Marginella gennesi p. 99 f. 2; — Cerithium yerburyi var. djiboutiensis p. 111 t.4 f. 9; — C. petrosum var. gennesi p. 111 t. 4 f. 7; — Clanculus gennesi p. 123 t. 4 f. 11, 12 (= Savigny t. 3 f. 3); — Pinna cochlearis p. 126 t. 4 f. 13.

„ 131. Dautzenberg, P., Diagnoses de deux Bulimulides nouveaux provenant du Perou (baeri und jocosensis).

„ 132. Ancey C. F., Etudes sur la Faune malacologique des îles Sandwich IV. Das Vorkommen von Merope barnaclei wird entschieden bestritten, jedenfalls mit Recht.

„ 138. Ancey, C. F., Notes critiques et synonymiques sur quelques Mollusques. (Buliminus hirasei Pilsbry = reticulatus Rve. — Pupa pyramidula Sykes = debilis Mouss; — Anisoloma n. subg. für P. ponsonbyana Morel; — Armandiella nom. nov. für Armandia, bei den Lepidopteren vergeben; — Cyclophorus dohertyi Smith = sericatus Ancey; — Diadema carolinarum Mlldff. = D. (Omphalotropis) angulosa Anc.).

„ 149. Choffat, Paul, Espèces nouvelles ou peu connues du Mésozoique Portugais. 1. Terebratula ribeiroi Lh. (pl. 4).

Brasil, L., Faune marine de la region de Luc-sur-Mer, Mollusques. — In: Bull Soc. Linn. Normandie, (5) IV. 1901. 155 Arten, keine neu.

Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique. — Tome XXXV. Année 1900.

p. 3. Vincent, E., Contribution à la Paléontologie de l'Eocène Belge. — Céphalopodes Dibranchiaux. — Avec pl. 1 und 2.

„ 8. Dupuis, P. & le Dr. Putzeys, Diagnoses de quelques Coquilles nouvelles provenant de l'Etat indépendant du Congo (mit Textfiguren). — Neu: Ganomidos fraterculus p. XIII f. 18; — Perideriopsis fallsensis p. XIV f. 19, 20; — P. moulaënsis p. XIV f. 21, 22; — Melania ponthiervillensis p. XIV p. XV f. 23, mit var. spoliata p. 24; — M. nyangweensis p. XVI f. 25; — M. depravata p. XVI f. 26. 27; — M. nsendweensis p. XVII f. 28, 29; — M. soror p. XVII f. 30; — M. consobrina p. XVIII f. 31, 32; — M. kinshassensis p. XIX f. 33, 34.

Melvill, J. Cosmo, and R. Standen, Report on the Mollusca of the „Jacson Harmsworth“ Expedition to Franz Josefs Land (1896—97), and of the „Andrew Coats“ Cruise (1898) to Kolguew etc. — In: Mem. Manchester Society, Session 1899—1900, vol. 44, pt. 4.

Neu Buccinum brucei p. 9 mit Fig.

Aus meiner

Perak-Original-Ausbeute

offerire

Hybocystis elephas, de Morgan

mit Deckel

in prächtigen Stücken à 10 Mk. — Weitere 35—40 spec. **Land-Conchylien** zu coulanten Preisen abgebbar.

Alb. Grubauer, Berlin, N.W.
Lessingstr. 19, hochparterre.

Testacellen-Schalen

trocken oder in Alkohol, werden zu kaufen gesucht.

„Linnaea“ Naturhist. Institut,
Berlin, Invalidenstr. 105.

Eingegangene Zahlungen:

Zoolog. Inst. der Universität Kiel, Mk. 12.—; Blum, J., Oberlehrer, Frankfurt a. M., Mk. 18.—; Kinkelin, Prof. Dr., Frankfurt a. M., Mk. 12.—; Senckenb. naturf. Gesellsch., Frankfurt a. M., Mk. 18.—; Ricklefs, Pfarrer, Minsen, Mk. 6.—.

Wohnorts-Veränderung.

Herr **Dr. O. von Möllendorff** wohnt jetzt: Frankfurt (Main)-Bockenheim, Adalbertstr. 11.

Verstorbene Mitglieder:

Maximilian, Graf von Otting, München. **Oberhofmarschall von Heimburg,** Oldenburg.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Peter Hartmann in Schwanheim a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.

Ausgegeben 16. Oktober.